



MINISTERUL SĂNĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL NAȚIONAL de SUPRAVEGHERE și CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE
Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro

Nr. 5095 din 22.05.2012

Catre,

Centrele Regionale de Sanatate Publica Bucuresti, Cluj, Iasi, Timisoara
TOATE Directiile de Sanatate Publica Judetene si a Mun.Bucuresti

CC: Ministerul Sanatatii-Directia de Sanatate Publica si Control in Sanatate Publica
Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Stimati colegi,

Va trimitem atasat documentul intitulat

**"Scrisoare metodologica privind vaccinarea BCG, citirea cicatricii vaccinale BCG si
recuperarea/vaccinarea copiilor nevaccinati in maternitate/cu cicatrice sub 3 mm".**

Cu stima,


**Director CNSCBT,
Dr. Adriana PISTOL**


Redactat, intocmit:
Dr.Odette Nicolae



Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"

Institutul National de Sanatate Publica
Centrul National de Supraveghere si Control
al Bolilor TransmisibileNr. 348 din 22.05.2012Nr. 5095 din 22.05.2012

**Scrisoare metodologica privind vaccinarea BCG,
citirea cicatricii vaccinale BCG si recuperarea/vaccinarea copiilor nevaccinati
in maternitate/cu cicatrice sub 3 mm**

1. **Vaccinarea BCG** se face la nou nascut in maternitate si este asigurata gratuit, in cadrul Programului National de Imunizare (PNI).
2. **Recuperarea copiilor nevaccinati BCG in maternitate** se face **fara testare la tuberculina**, in cabinetul medicului de familie, **pana la varsta de 3 luni**.
3. **Citirea cicatricii vaccinale BCG** se face la varsta de **6 luni**, in cabinetul medicului de familie.
4. Vaccinarea copiilor cu cicatrice **sub 3 mm** se face **dupa testarea prealabila la tuberculina (2U PPD), cu avizul medicului pneumoftiziolog**, in cabinetul de pneumoftiziologie/al medicului de familie.
5. **Dupa varsta de 3 luni**, recuperarea copiilor nevaccinati BCG in maternitate sau a celor care vin nevaccinati din alte tari se face **dupa testarea prealabila la tuberculina (2U PPD), cu avizul medicului pneumoftiziolog**, in cabinetul de pneumoftiziologie/al medicului de familie.

Avizul medicului pneumoftiziolog este necesar pentru a evita vaccinarea BCG a copiilor provenind din focare de tuberculoza care risca, in cazul vaccinarii, o diseminare hematogena (pulmonara, meningeala etc.).

**Coordonator tehnic National
al PNCT**

Dr. Gilda Popescu



**Coordonator Subprogram 2.3.
din partea INSP-CNSCBT**

Dr. Odette Nicolae