

## Diagnosticul diferential al poliomielitei si a altor paralizii acute flasce

	<b>Poliomielita</b>	<b>Poliradiculonevrita acuta (Sindr. Guillain-Barre)</b>	<b>Nevrita traumatica</b>	<b>Mielita transversa</b>
<b>Instalarea paraliziei</b>	Completa in 24-48 ore de la debut	De la citeva ore la 10 zile	De la citeva ore la 4 zile	De la citeva ore la 4 zile
<b>Febra la debut</b>	Mare si intotdeauna prezenta la debut, apoi dispare in urmatoarele zile	Nu este preznta de obicei	De obicei prezenta inainte, dupa si dupa aparitia. paraliziei flasce	f. rar prezenta
<b>Tipul paraliziei flasce</b>	Acuta, asimetrica, de obicei in zone proximale	In general acuta, simetrica si distala	Asimetrica, acuta si afecteaza numai membrele	Acuta, simetrica, la membrele inferioare
<b>Tonusul muscular</b>	Redus sau absent la membrul afectat	Hipotonie generalizata	Redus sau absent la membrul afectat	Hipotonie in membrele inferioare
<b>Reflexele osteo-tendinoase</b>	Scazute sau absente	Total absente	Scazute spre absente	Absente la memebrele inferioare si hiper-reflexie tarzie
<b>Sensibilitatea</b>	Dureri musculare severe dar fara modificari de sensibilitate (cald-rece )	Crampe musculare, fasciculatii, hipoanestezie palmara si plantara	Durere in muschii fesieri si scaderea senzatiei de caldura	Anestezie in membrele inferioare
<b>Afectarea nervilor cranieni</b>	Numai in cazul cuprinderii bulbului	Adesea prezenta, cu afectarea nervilor VII, IX, X, XI, XII	absenta	absenta
<b>Insuficienta respiratorie</b>	Prezenta numai in prinderea bulbului	In cazuri severe si accentuate de o eventuala complicatie cu pneumonie bacteriana	absenta	Posibila – rar

<b>Semne si simptome de insotire - manifestari vegetative)</b>	rare	Modificari ale tensiunii arteriale, transpiratii si fluctuatii ale temperaturii corporale	Hipotermie in membrul afectat	prezente
<b>LCR</b>	Aspect inflamator	Disociatie albumin-citologica	normal	Normal sau usoare crestere celulara
<b>Viteza de conducere nervoasa (sapt. A IIIa de boala)</b>	Anormala – ca in boala cornului anterior al maduvei (este normal in primele 2 saptamini dupa debut)	Anormala- conducere incetinuta, amplitudine motorize scazuta	Anormala – data de lezarea axonala	Normal sau anormala, fara valoare de diagnosticare
<b>EMG</b>	anormala	normala	normala	normala
<b>Sechele la 3 luni de la debut pina la un an</b>	Severe, asimetrice, atrofie, deformari ale scheletului care se dezvoltă mai tarziu	Simetrice, atrofie a muschilor distali (de obicei se recupereaza ad integrum)	Atrofie moderata, si numai in membrul afectat	Diplegie atrofica dupa ani de la debut